

Puffin Arcade

Puffin Arcade Regular

Puffin Arcade Liquid

Puffin Arcade Loadout

Puffin Arcade Fuzzle

Puffin Arcade Level

Puffin Arcade Nerf

Puffin Arcade Marn

Puffin Arcade Mine

Puffin Arcade Chrome

Puffin Arcade Yoko

Puffin Arcade Tate

Puffin Arcade Checkers

DESIGNER
PIETER VAN ROSMALEN

DESIGN YEAR
2012 – 2020

ABOUT

Puffin Arcade is an entertaining family of 12 bitmapped fonts based on the most heavy weight of Puffin Display Soft. Each style has a different design theme, from Dither, the overlapping Nerf style, via Liquid, Warp or Wipe, Yoko or Tate, to Level or Foozle variants.

All individual styles except Foozle can be layered on top of each other for extra effect, basically begging to be used in blinking, flashing and running multi-colour animations. But if you must, you can rein the flock in again and combine it with the calmer Puffin and Puffin Display.

SUPPORTED LANGUAGES

Afrikaans, Albanian, Asu, Basque, Bemba, Bena, Bosnian, Catalan, Chiga, Colognian, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Embu, English, Esperanto, Estonian, Faroese, Filipino, Finnish, French, Friulian, Galician, Ganda, German, Gusii, Hungarian, Icelandic, Inari Sami, Indonesian, Irish, Italian, Jola-Fonyi, Kabuverdianu, Kalaallisut, Kalenjin, Kamba, Kikuyu, Kinyarwanda, Latvian, Lithuanian, Lower Sorbian, Luo, Luxembourgish, Luyia, Machame, Makhuwa-Meetto, Makonde, Malagasy, Malay, Maltese, Manx, Meru, Morisyen, North Ndebele, Northern Sami, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Nyankole, Oromo, Polish, Portuguese, Romanian, Romansh, Rombo, Rundi, Rwa, Samburu, Sango, Sangu, Scottish Gaelic, Sena, Shambala, Shona, Slovak, Slovenian, Soga, Somali, Spanish, Swahili, Swedish, Swiss German, Taita, Teso, Turkmen, Upper Sorbian, Vunjo, Walser, Welsh and Zulu.

PELAGIC SEABIRD

frailecillos

North Pacific

yellowish-brown

oiseaux

BOTH PARENTS INCUBATE THE EGG

ALMEN

küçük balık

PUFFIN ARCADE REGULAR 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE REGULAR 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE REGULAR 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In IJsland leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE LIQUID 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE LIQUID 26/26 PT

The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE LIQUID 18/18 PT

The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE LOADOUT 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. His *voleme relatifement* has *surdehors de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,5 m (5,2 pi) d'autres pingouins*. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE LOADOUT 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Its volant relatif-
vement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE LOADOUT 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Its volant relatif-
vement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE FOOZLE 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE FOOZLE 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE FOOZLE 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE LEVEL 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Its volant relativement haut et au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,5 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE LEVEL 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1769 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 19 m (63 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE LEVEL 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1769 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 19 m (63 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, mais voadoras: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE NERF 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE NERF 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE NERF 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE WARP 44/44 PT

**The nonne Eratorcula
was introduced by the
French zoologist Mathurin
Jacques Brisson in 1760
with the Atlantic puffin
(Eradorcula arctica) as the
type species. It is a
relatively high sea-
bird of the ocean. Generally
it is 10 cm (3.9 in) in
length and 1.6 m (5.2 ft)
in wingspan. It is
found in large colonies
on rocky coasts and**

PUFFIN ARCADE WARP 26/26 PT

The genus *Eratorcula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Eratorcula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1.6 m (5.2 pi) d'autres pingouins. Sie hriiten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf Klippenabhängen Inseln, nisten in Felsenalpen unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Danoegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE WARP 18/18 PT

The genus *Eratorcula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Eratorcula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1.6 m (5.2 pi) d'autres pingouins. Sie hriiten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf Klippenabhängen Inseln, nisten in Felsenalpen unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Danoegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Erman naria e relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, u lo incuban ambos padres. São, no entanto, mais unaderos: quando levantam uão, unam baixe sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE WIPE 44/44 PT

The name *Castoreus*
was introduced by the
French zoologist Mathurin
Jacques Brisson in 1769
with the Atlantic mink
Castoreus castor as the
type species. He used
relationship with the
doom de l'oeil. *Castoreus*
mont à 10 m 100 m 100 m
mont à 10 m 100 m 100 m
mont à 10 m 100 m 100 m
d'autres espèces. *Castoreus*
huiton in großen Kolonien
an Stellenorten oder auf

PUFFIN ARCADE WIPE 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1 à 3 m (5 à 9 pi) d'autres pingouins. Ils hivernent en grandes colonies en Stellvioeten oder auf Klippenhöhlen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Donsduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE WIPE 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1 à 3 m (5 à 9 pi) d'autres pingouins. Ils hivernent en grandes colonies en Stellvioeten oder auf Klippenhöhlen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Donsduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Formas nroas e relacionas a larga plazo. La hombre pone un solo huevo u la incuban ambos padres. São no entanto, mais modernas: quando levantam um, usam baivo sobre a fêmea, batendo as asas

PUFFIN ARCADE CHROME 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE CHROME 26/26 PT

The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE CHROME 18/18 PT

The genus Fratercula was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (Fratercula arctica) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE YOKO 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE YOKO 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE YOKO 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE TATE 44/44 PT

The graphics particularly
was introduced by the
French zoologist Philippe
Jacques Berissier in 1760
with the Atlantic publication
(Particulars and the
type species. His work
related to the heart and
classes of the, general
work in 100 mm (33 pt) per
square inch 1,6 mm (5,2 pt)
of the species per square. See
history in general. The
and scientific order and

PUFFIN ARCADE TATE 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman

PUFFIN ARCADE TATE 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

PUFFIN ARCADE CHECKERS 44/44 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf

PUFFIN ARCADE CHECKERS 26/26 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een be-

PUFFIN ARCADE CHECKERS 18/18 PT

The genus *Fratercula* was introduced by the French zoologist Mathurin Jacques Brisson in 1760 with the Atlantic puffin (*Fratercula arctica*) as the type species. Ils volent relativement haut au-dessus de l'eau, généralement à 10 m (33 pi) par rapport aux 1,6 m (5,2 pi) d'autres pingouins. Sie brüten in großen Kolonien an Steilküsten oder auf küstennahen Inseln, nisten in Felsspalten unter Felsen oder in Höhlen im Boden. In Island leeft de grootste kolonie van de Atlantische Papegaiduiker, maar ook de Hebriden zijn een bekend gebied waar zij leven. Forman pareja o relaciones a largo plazo. La hembra pone un solo huevo, y lo incuban ambos padres. São, no entanto, maus voadores: quando levantam vôo, voam baixo sobre a água, batendo as asas

OPENTYPE FEATURES

CONTEXTUAL ALTERNATES

fb f" ffb ff" ...
fb f" ffb ff" ...

STANDARD LIGATURES

fi fl ff
fi fl ff

ORDINALS

a o
a o

TABULAR NUMERALS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FRACTIONS

1/2 3/8 45/79
1/2 3/8 45/79

NUMERATORS

0123456789
0123456789

DENOMINATORS

0123456789
0123456789

SUPERIOR NUMERALS

0123456789
0123456789

INFERIORS NUMERALS

0123456789
0123456789

DOTTED ZERO

0
0

ALTERNATE LOWERCASE A

áâãäåäåäåä
áâãäåäåäåä

ALTERNATE UPPERCASE I

iiiiiijjii
íîïîïîïî

ALTERNATE UPPERCASE M

M
M